

In studieverband
 Buiten studieverband

R-VIM

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT:	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m2)	Pat.studienr:
	Code kuur E2↓			
	<input type="checkbox"/>	339966E	chemo-immuno	
	Naam + paraaf Arts	Naam + paraaf supervisor	Naam + paraaf VPK1	Naam + paraaf VPK2
Specialisme: IHM Indicatie: CD20 positief NHL salvage Cyclusduur: 2-3 wk (eventueel afgewisseld met R-Dhap) Totaal: 3 cycli Bron: www.hovon.nl/Hovon 44	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)			

Opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

** MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen

Datum	In EVS plaatsen	Dag	Tijden	GENEESMIDDEL	TW *	Dosis	Pompstand	Paraaf 1	Paraaf 2= Aanhangen
	ja	Dag 1	half uur voor gift Rituximab toedienen	Prednisolon Paracetamol Clemastine (Tavegil)	i.v. p.o. i.v.	25 mg 1000 mg 2 mg		**	**
			10.00	RITUXIMAB 1dd 375 mg/m ²	i.v.mg			

Gebruik voor toedienen Rituximab separaat schema t.a.v. inloopsnelheid, voorzorgsmaatregelen, bijwerkingen, etc. (zie www.hematologiegroningen.nl)

		Dag 2	09.00–11.00	ETOPOSIDE totaal 1 x 90 mg/m ² /dd in 500 ml NaCl 0,9% inlooptijd: 2 uur	i.v.mg			
			11.15–11.30	METHOTREXAAT totaal 1 x 30 mg/m ² /dd in 50 ml NaCl 0,9% inlooptijd: 15 min	i.v.mg			
			12.00–13.00	IFOSFAMIDE totaal 1dd 1200 mg/m ² + Mercapto-ethaansulfonzuur (Mesna) totaal 1x 10mg/kg in 250ml NaCl 0,9% inlooptijd: 60 min.	i.v.mgmg			
	ja		13.00–21.00	Mercapto-ethaansulfonzuur (Mesna) totaal 1 x 20 mg/kg in 1000 ml NaCl 0,9% inlooptijd: 8 uur (direct aansluitend op Ifosfamide/ Mercapto-ethaansulfonzuur (Mesna))	i.v.mg		**	**

		Dag 3	12.00–13.00	IFOSFAMIDE totaal 1dd 1200 mg/m ² + Mercapto- ethaansulfonzuur (Mesna) totaal 1x 10mg/kg	i.v.mgmg		
	ja		13.00–21.00	Mercapto- ethaansulfonzuur (Mesna) totaal 1 x 20 mg/kg	i.v.mg	**	**
		Dag 4	09.00–11.00	ETOPOSIDE totaal 1 x 90 mg/m ²	i.v.mg		
			12.00–13.00	IFOSFAMIDE totaal 1dd 1200 mg/m ² Mercapto- ethaansulfonzuur (Mesna) totaal 1x 10mg/kg	i.v.mgmg		
	ja		13.00–21.00	Mercapto- ethaansulfonzuur (Mesna) Totaal 1 x 20 mg/kg	i.v.mg	**	**
		Dag 5	12.00–13.00	IFOSFAMIDE totaal 1dd 1200 mg/m ² Mercapto- ethaansulfonzuur (Mesna) totaal 1x 10mg/kg	i.v.mgmg		
	ja		13.00–21.00	Mercapto- ethaansulfonzuur (Mesna) totaal 1 x 20 mg/kg	i.v.mg	**	**
		Dag 6	09.00–11.00	ETOPOSIDE totaal 1 x 90 mg/m ²	i.v.mg		
			11.15–11.30	METHOTREXAAT totaal 1 x 30 mg/m ²	i.v.mg		
			12.00–13.00	IFOSFAMIDE totaal 1dd 1200 mg/m ² Mercapto- ethaansulfonzuur (Mesna) totaal 1x 10mg/kg	i.v.mgmg		
	ja		13.00–21.00	Mercapto- ethaansulfonzuur (Mesna) Totaal 1 x 20 mg/kg	i.v.mg		
	ja	Dag 7	21.00	Pegfilgrastim <i>Niet geven indien stamcelmobilisatie, dan start Filgrastim</i>	s.c	6 mg	**	**

Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS

Datum	Paraaf arts zodra in EVS geplaatst	Hydratieschema/ medicatie
		Hydratie: in aansluiting op Ifosfamide/Mesna infuus: 2l NaCl 0,9 % waarin per liter +.....mmol KCL(30 ml KCL per liter toevoegen)
		Dag 2 t/m 7 : 3 ddmg Furosemide (Lasix) i.v. push (gedurende hyperhydratie)
		Ondansetron 2 dd 8 mg i.v., dag 1 t/m dag 7 (zie voor volledig anti emetica beleid www.hematologiegroningen.nl)
		Dexamethason 1 dd 8 mg dag 2 en 3 i.v
		Metoclopramide 3 dd 10 mg i.v. zo nodig
		Lorazepam 4 dd 0.5 mg s.l., als sedativum <i>toevoegen</i> Z.N (niet als monotherapie) na de kuurdagen
		Norethisteron (Primolut N.) 2 x 5 mg/p.o. (bij vrouwen voor de menopauze)
		S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl
		op indicatie: Allopurinol (1 x 300 mg/ p.o.)
		Dag 7 cyclus 2 of 3 (inclusief R-Dhap) G-CSF 1 dd 5 ug/kg voor stamcelmobilisatie
		Bloedproducten bestralen bij 2^e of 3^e cyclus i.v.m. aferese.

MEDISCHE INSTRUCTIES

- Perifeer infuus
- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam
- Dagelijks nierfunctie bepalen t/m dag van ontslag
- Bij gestoorde nierfunctie sterk verhoogde kans op myocardtoxiciteit
- Eerstvolgende poliklinische controle lab + ECG controle (zie anti-emetica beleid, mogelijke interacties)
- Denk aan separaat toedienschema Rituximab

VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES

- Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
- Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 7 dagen na de laatste gift Methotrexaat worden opgeheven; datum ...
- Dagelijks 2 dd wegen ten behoeve vochtbalans (≥2 kg Furosemide toedienen i.o.m arts)
- Dagelijkse observatie en inspectie mucositis en instructie mondverzorging
- Denk aan separaat toedienschema Rituximab