

In studieverband
 Buiten studieverband

EORTC 1301-LG
Arm A, Cyclus 3 (evt 4); mini ICE

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT: 1970	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m2)	Pat.studienr:
	Code kuur E2↓			
	<input type="checkbox"/>	339966C	chemo acute leukemie	
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor	Naam + paraaf VPK1	Naam + paraaf VPK2
Specialisme: IHM Indicatie: AML ≥ 60 jaar Cyclusduur: Na cyclus 2; start als ANC ≥ 1.0x10 ⁹ /L Totaal: na cyclus 3 evt dit schema als 4 ^e kuur geven (mits ANC ≥ 1.0x10 ⁹ /L) Bron: 1301-LG EORTC	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)			

Opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

** MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen

Datum	In EVS plaatsen	Dag	Tijden	GENEESMIDDEL	TW *	Dosis	Pomp- stand	Paraaf 1	Paraaf 2= aanhangen
		Dag 1	09.00-10.00	ETOPOSIDE 100mg/m ² in 500ml NaCl 0,9% inlooptijd: 1 uur	i.v.mg			
			11.00-11.30	IDARUBICINE 8mg/m ² in 50ml NaCl 0,9% inlooptijd: 30 min	i.v.mg			
			11.00-09.00	CYTARABINE 100mg/m ² in 1000ml NaCl 0,9% inlooptijd 22 uur	i.v.mg			
		Dag 2	11.00-09.00	CYTARABINE 100mg/m ²	i.v.mg			
			09.00-10.00	ETOPOSIDE 100mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 3	09.00-10.00	ETOPOSIDE 100mg/m ²	i.v.mg			
			11.00-11.30	IDARUBICINE 8mg/m ²	i.v.mg			
			11.00-09.00	CYTARABINE 100mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 4	11.00-09.00	CYTARABINE 100mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 5	11.00-11.30	IDARUBICINE 8mg/m ²	i.v.mg			
			11.00-09.00	CYTARABINE 100mg/m ²	i.v.mg			

Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS

Datum	Paraaf arts zodra in EVS geplaatst	Hydratieschema/ medicatie
		Hydratie: 2l Gluc2.5%/NaCl0,45% met per 500 ml:mmol KCl (10 mmol per 500 ml)
		Start dag 1: Furosemide (lasix) 2ddmg push/i.v.
		Dag1 t/m 6: Ondansetron (zofran) 2 dd 8 mg i.v.
		S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl
		Dag 1 t/m regeneratie Hypromellose 0,3% oogdruppels 6 x dd
		Allopurinol 300mg: 1 ddmg

MEDISCHE INSTRUCTIES


- CVK
- Berekening
- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam
- Beenmergpunctie op dag +28 (± 7 dagen)

VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES

- Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
- Maatregelen kuur (ph meten urine, voorbereidingen, etc).
- Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 6 dagen na de laatste gift Idarubicine worden opgeheven; datum:
- Dagelijks wegen ten behoeve van vochtbalans.
- Mucositisscore bijhouden.
- Mondverzorging.
- Onderstaande mogelijk niet nodig i.v.m. lagere dosis Cytarabine
 - Huidverzorging: Vette zalf aanbieden, evt. katoenen handschoenen geven bij rash van de huid/handen t.g.v. Cytarabine.
 - Adviseer patiënt: voeten vettig houden en dikke sokken dragen.
 - Eventueel: assisteer patiënt bij toedienen oogdruppels, indien hypromellose niet afdoende is (gevoel van zand in de ogen) overleg met arts mbt andere oogdruppels zoals corticosteroïde-druppels).

ACHTERGRONDINFORMATIE

Figure: Study flowchart



Cytarabine (Ara-C); bone marrow (BM); absolute neutrophil count (ANC); progressive disease (PD); complete remission (CR); partial remission (PR); stable disease (SD); allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (alloHCT).

Idarubicine

Synoniem: 4-Demethoxydaunomycine (D-DNM)

- Cytostaticum: behoort tot antracyclinegroep
- Urine kan oranje gekleurd zijn. Dragen van contactlenzen eerste 48 uur na toediening niet toegestaan.
- Bijwerkingen: beenmergdepressie, infectie, koorts, misselijkheid, braken, diarree, mucositis, stomatitis

Cytarabine

Synoniem: cytosine arabinoside, ARA-C, Depocyt

- Eigenschappen: Cytostaticum behorende tot de anti-metaboliëten.
- Bijwerkingen: beenmergsuppressie misselijkheid en braken, huidrash, met pijn en blaarvorming vooral van handen en voeten, afhankelijk van de hoogte van de dosering en toedieningswijze leverfunctiestoornissen zelden koorts, stomatitis, haaruitval, anorexie, diarree, bij hoge dosering conjunctivitis (profylaxe met hypromellose oogdruppels noodzakelijk)

Etoposide

Synoniem: EPEG, Toposin, Vepesid, VP16, VP16213

- Eigenschappen: Cytostaticum, Topoisomerase-2-remmer
- Bijwerkingen: anafylactische reacties, zoals koorts, blozen, tachycardie, bronchospasmen, hypotensie infecties, anorexie