

In studieverband :.....

Buiten studieverband

**HOVON 119 MCL R2 Elderly maintenance:
RITUXIMAB SUBCUTAAN MET OF ZONDER LENALIDOMIDE**

Therapielijst\aftekenlijst\aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12NAT02010	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)	
	Code kuur E2:	339966F	immunotherapie	
	Naam + paraaf arts		Naam + paraaf supervisor	
Specialisme: IHMP Indicatie: mantelcellymfoom Cyclusduur: R à 8 weken Totaal: R gedurende 24 maanden (13 keer)	Afspraakcodes DC: RITUXSUBCU: 1 uur	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

Alleen in experimentele arm:

Opmerkingen:

DATUM	DAG	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	TOELICHTING
	2 t/m 22	LENALIDOMIDE 15 mg* <i>Studierecept nodig</i>	p.o.		studierecept arts; elke 4 weken gedurende 24 maanden of 26 kuren; <u>alleen in experimentele arm</u>

* Patiënten met een klaring tussen 30-60 ml/min krijgen eerste 2 kuren 10 mg. Nadien bij ontbreken van graad 3-4 toxiciteit ophogen naar 15 mg.

NB. Patiënten in de lenalidomide-arm die eerder een DVT hebben gehad: schrijf tromboseprofylaxe voor (pagina 41).

Kuur:.....

*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	TOEDIEN TIJD	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	TOELICHTING	Par 1	Par 2	
	1					b. RR, pols, temp			
			PREDNISOLON	p.o.	25 mg				
				LEVOCETERIZINE	p.o.	5 mg			
				PARACETAMOL	p.o.	1000 mg			
		00:30					30 min. wachten		
		± 5-6 minuten		RITUXIMAB SC 1400 mg in 11,7 ml <i>Studierecept nodig</i>	SC	1400 mg	a. b.		
		00:15		observatie			observatie		


Verpleegkundige toedien-instructies

- a. Injecteer in de buikwand in een voor de patiënt comfortabele toediensnelheid in ongeveer 5-6 minuten. Niet op plekken waar de huid rood, gevoelig, gekneusd of hard is. Niet masseren na injecteren.
- b. Noteer controles en tijdstip injectie op **controlelijst**.
- Eventuele andere geneesmiddelen voor subcutane toediening moeten gedurende de behandeling met Rituximab sc op een andere plaats worden toegediend.

Achtergrondinformatie HOVON 119 MCL R2 Elderly maintenance: Rituximab subcutaan met of zonder lenalidomide

Informatie over de studie:

- Zie webpagina www.hematologiegroningen.nl.
- HOVON 119 MCL R2 Elderly: de effectiviteit wordt onderzocht van immunochemotherapie bestaande uit alternerende R-CHOP en R-HAD versus alleen R-CHOP (inductie), indien CR, CRu of PR gevolgd door maintenance therapie bestaande uit Rituximab subcutaan met Lenalidomide versus Rituximab subcutaan zonder Lenalidomide (zie andere toedienlijst).
- Het betreft een internationale, multicentrum, open label, gerandomiseerde fase 3 studie voor patiënten van 60 jaar of ouder met eerder onbehandeld mantelcellymfoom.
- Dosismodificaties: zie studieprotocol pagina 33.



Informatie over de geneesmiddelen:

- Doxorubicine: Cytostaticum behorende tot de antibiotica.
- Vincristine: Antimitotisch cytostaticum behorende tot de vinca-alkaloïden.
 - De neurologische toxiciteit is de belangrijkste bijwerking van Vincristine. Dit kan zich onder andere uiten in perifere neuropathie, obstipatie of ilieus. Neurologische toxiciteit is dosis en leeftijd gerelateerd. In het algemeen zijn de bijwerkingen reversibel. De Vincristine dosering wordt verminderd bij neurotoxiciteit.
- Cyclofosfamide: Cytostaticum behorende tot de alkylerende middelen.
 - Grapefruit en pompoes bevatten een verbinding die de werking van cyclofosfamide kan verminderen.
- Prednisolon: Corticosteroïd met glucocorticoïde eigenschappen.
- Rituximab (MabThera): Rituximab is een genetisch geconstrueerd chimerisch muis/humaan monoklonaal antilichaam. Rituximab bindt zich specifiek aan het transmembraanantigeen CD20, een niet-geglycosyleerd fosfoproteïne, voorkomend op jonge en volwassen B-cellen.

De subcutane formulering van Rituximab bevat recombinant humaan hyaluronidase (rHuPH20), een enzym dat wordt gebruikt om de verdeling en absorptie van gelijktijdig toegediende stoffen te verhogen, wanneer deze subcutaan worden toegediend.

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Studie-informatie uitgereikt door arts.

Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

Doxorubicine:

- Stel de patiënt gerust wat betreft mogelijk roodgekleurde urine.
- Adviseer de patiënt de 1^e 48 uur na infusie geen contactlenzen te dragen.

Vincristine:

- Instrueer de patiënt neuropathische klachten te melden aan de behandelend arts.

Cyclofosfamide:

- Adviseer de patiënt extra te drinken en urine snel uit te plassen.
- Instrueer de patiënt geen grapefruit en pomelmoes te eten en geen grapefruitsap en pomelmoessap te drinken.

Prednisolon:

- Adviseer de patiënt Prednisolon 's morgens in te nemen. Bij de eerste kuur controle huisarts op glucosespiegel 's middags (2 uur na de lunch).

Contact:

- Onderzoeksarts: Dr. M. Nijland
- Researchverpleegkundige: H. Klooster
- Datamanager: Erna Helmantel
- Trialconsulent: Iris Holt

Controlelijst: HOVON 119 maintenance: Rituximab subcutaan met of zonder Lenalidomide

Kuur:.....

Datum:.....

Sticker patiëntgegevens

start- en stoptijden medicatie:

Tijdstip injectie Rituximab:.....uur

Controles:

Tijdstip:	RR	Pols	AH	Temp	Sat	Paraaf

Bijzonderheden: