

In studieverband
 Buiten studieverband

HOVON 103 - ARM-A
1^e INDUCTIEKUUR

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT: 01426	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m2)	
	Code kuur E2↓			
	<input type="checkbox"/>	339966C	chemo acute leukemie	
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor	Naam + paraaf VPK1	Naam + paraaf VPK2
Specialisme: IHM Indicatie: AML en RAEB≥66 jr en very poor risk AML≥18jr Cyclusduur: > 21 dagen Totaal: 2 cycli Bron: www.hovon.nl/ hovon 103		Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

Opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

** MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen

Datum	In EVS plaats en	Dag	Tijden	GENEESMIDDEL	TW *	Dosis	Pomp- stand	Paraaf 1	Paraaf 2= aanhangen
		Dag 1	10.00–13.00	DAUNORUBICINE <i>1x 45 mg/m²</i> In 250 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 3 uur	i.v.mg			
			14.00–12.00	CYTARABINE (ARA-C) <i>1x 200 mg/m²</i> In 1000 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 22 uur	i.v.mg			
		Dag 2	10.00–13.00	DAUNORUBICINE <i>45 mg/m²</i>	i.v.mg			
			14.00–12.00	CYTARABINE <i>200 mg/m²</i>	i.v.mg			
		Dag 3	10.00–13.00	DAUNORUBICINE <i>45 mg/m²</i>	i.v.mg			
			14.00–12.00	CYTARABINE <i>200 mg/m²</i>	i.v.mg			
		Dag 4	14.00–12.00	CYTARABINE <i>200 mg/m²</i>	i.v.mg			
		Dag 5	14.00–12.00	CYTARABINE <i>200 mg/m²</i>	i.v.mg			
		Dag 6	14.00–12.00	CYTARABINE <i>200 mg/m²</i>	i.v.mg			
		Dag 7	14.00–12.00	CYTARABINE <i>200 mg/m²</i>	i.v.mg			

patiëntensticker

Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS

Datum	Paraaf arts zodra in EVS geplaatst	Hydratieschema/ medicatie
		Hyperhydratie is niet standaard geïndiceerd, alleen bij: hyperuricaemie, hoge tumorload, splenomegalie $L > 30 \times 10^6/l$l Gluc 2,5%/zout 0,45% met per liter: ml NaBicarbonaat 8,4% (60ml) ml KCl (20 ml)
		Dag1: Furosemide (Lasix) x dd i.v. push
		Ondansetron (zofran) i.v voorafgaand aan kuur, daarna: 2 x dd 8 mg/p.o. dag 1 t/m 8.
		S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl
		Benzylpenicilline-natrium (Penicilline) 4x1 milj E/i.v.: start dag + 8 t/m herstel bloedwaarden
		Allopurinol 1 x dd 300 mg/p.o.
		Pyridoxine 1 x 250 mg/dd/p.o. t/m dag 9
		Hypromellose 0,3% oogdruppels 6 xdgs. Dag 1 t/m herstel bloedwaarden

MEDISCHE INSTRUCTIES

- CVK
- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam
- Bij allergie op Benzylpenicilline-natrium (Penicilline), Co-trimoxazol (Bactrimel) 3 x 960 mg/dd/p.o. in plaats van Benzylpenicilline-natrium (penicilline) en ciprofloxacin (ciproxin)
- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam

VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES

- Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
- Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 6 dagen na de laatste gift Cytarabine worden opgeheven; datum:
- Dagelijks wegen ten behoeve van vochtbalans.
- Mucositis score bijhouden.
- Mondverzorging.
- Centraal veneuze katheter
- SIB opmaat uitreiken <http://www.sibopmaat.nl/>

ACHTERGRONDINFORMATIE

Daunorubicine (Synoniem: Rubidomycine)

- Cytostaticum, anthracycline
- [link](#)
- Urine kan oranje gekleurd zijn. Dragen van contactlenzen eerste 48 uur na toediening niet toegestaan.
- Attentie bij extravasatie: blaarvormend; zie crashkaart

Cytarabine (Synoniem: ARA-C, DepoCyte, Alexan, Cytosine-arabinoside, Cytosar)

- Anti-metabool
- [link](#)
- bij hoge dosering conjunctivitis (profylaxe met hypromellose oogdruppels)
- Bij ARA-C uitslag aan handen en/of voeten kan koelzalf er op aanbrengen de klachten verlichten. Er zijn katoenen handschoenen om de handen te beschermen beschikbaar. Bij zeer ernstige klachten kan de arts overwegen om prednisolon voorschrijven.