

In studieverband
 Buiten studieverband

**HOVON 103 - AML >66 jr
 ARM-A
 2^e INDUCTIEKUUR**

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT: 01426	Gefaxt naar apothek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m2)	
	Code kuur E2↓			
	<input type="checkbox"/>	339966C	chemo acute leukemie	
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor	Naam + paraaf VPK1	Naam + paraaf VPK2
Specialisme: IHM Indicatie: AML en RAEB≥66 jr en very poor risk AML≥18jr Cyclusduur: > 21 dagen Totaal: 2 cycli Bron: www.hovon.nl/ hovon 103		Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

Opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

** MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen

Datum	In EVS plaats en	Dag	Tijden	GENEESMIDDEL	TW *	Dosis	Pomp- stand	Paraaf 1	Paraaf 2= aanhangen
		Dag 1	09.00–15.00	CYTARABINE 2 x 1000mg/m ² In 500 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 6 uur	i.v.mg			
			21.00–03.00	CYTARABINE 1000 mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 2	09.00–15.00	CYTARABINE 1000 mg/m ²	i.v.mg			
			21.00–03.00	CYTARABINE 1000 mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 3	09.00–15.00	CYTARABINE 1000 mg/m ²	i.v.mg			
			21.00–03.00	CYTARABINE 1000 mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 4	09.00–15.00	CYTARABINE 1000 mg/m ²	i.v.mg			
			21.00–03.00	CYTARABINE 1000 mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 5	09.00–15.00	CYTARABINE 1000 mg/m ²	i.v.mg			
			21.00–03.00	CYTARABINE 1000 mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 6	09.00–15.00	CYTARABINE 1000 mg/m ²	i.v.mg			
			21.00–03.00	CYTARABINE 1000 mg/m ²	i.v.mg			

patiëntensticker

Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS

Datum	Paraaf arts zodra in EVS geplaatst	Hydratieschema/ medicatie
		Hyperhydratie is niet standaard geïndiceerd,l Gluc 2,5%/NaCl 0,45% met per liter: ml KCl (20 ml)
		Dag1: Furosemide (Lasix) x dd.....mg/ i.v. push
		Ondansetron (zofran) i.v voorafgaand aan kuur, daarna: 2 x dd 8 mg/p.o. dag 1 t/m 7.
		S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl
		Benzylpenicilline-natrium (Penicilline) 4x1 milj E/i.v.: start dag + 8 t/m herstel bloedwaarden
		Indien nog hoge tumorload: Allopurinol 1 x dd 300 mg/p.os
		Pyridoxine 1 x 250 mg/dd/p.o. t/m dag 6
		Hypromellose 0,3% oogdruppels 6 xdgs. Dag 1 t/m herstel bloedwaarden

MEDISCHE INSTRUCTIES

- CVK
- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam
- Bij allergie op Benzylpenicilline-natrium (Penicilline), Co-trimoxazol (Bactrimel) 3 x 960 mg/dd/p.o. in plaats van Benzylpenicilline-natrium (penicilline) en ciprofloxacine (ciproxin)
- Bij bekende allergie op cytarabine, overweeg lage dosis Prednisolon (20mg/dd/p.os), dag 1 t/m dag 6
- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam

VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES

- Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
- Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 6 dagen na de laatste gift cytarabine worden opgeheven; datum:
- Dagelijks wegen ten behoeve van vochtbalans.
- Mucositis score bijhouden.
- Mondverzorging.
- Centraal veneuze katheter
- SIB opmaat uitreiken <http://www.sibopmaat.nl/>

ACHTERGRONDINFORMATIE

Cytarabine (Synoniem: ARA-C, DepoCyte, Alexan, Cytosine-arabinoside, Cytosar)

- Anti-metabool
- [link](#)
- bij hoge dosering conjunctivitis (profylaxe met Hypromellose oogdruppels)
- Bij ARA-C uitslag aan handen en/of voeten kan koelzalf er op aanbrengen de klachten verlichten. Er zijn katoenen handschoenen om de handen te beschermen beschikbaar. Bij zeer ernstige klachten kan de arts overwegen om Prednisolon voorschrijven.