

## Nivolumab bij recidief Hodgkin lymfoom

### Therapielijst/aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntgegevens:	Datum aanvraag	Afdeling		Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m <sup>2</sup> )	
	Code kuur E2:	339966F	immunotherapie	
	Naam + paraaf arts		Naam + paraaf supervisor	
Specialisme: IHMP Indicatie: Recidief Hodgkin lymfoom Cyclusduur: 2 weken Totaal: tot progressie of onacceptabele toxiciteit Bron:	Afspraakcodes DC: NIVOLUMAB: 1 uur	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

**Opmerkingen:.....**

**Kuurnummer: .....**

\*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	INLOOPTIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW*	DOSIS	POMP- STAND	TIV	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	1							RR, pols, temp		
	1	00.30	<b>NIVOLUMAB</b> in 100 ml NACL0,9%	iv	240 mg			Filter 0,2 µm		

### Verpleegkundige toedien-instructies

- Observeer op infusie- en overgevoelighedsreacties.

patiëntgegevens

## Achtergrondinformatie Nivolumab bij recidief Hodgkin lymfoom.

### Informatie over de kuur:

- Zie link naar webpagina: <https://hematologiegroningen.nl/protocollen/> : Maligne lymfomen: Hodgkin en NHL

### Informatie over de geneesmiddelen:

#### Informatie over het geneesmiddel:

- Nivolumab (BMS-936558): humaan monokonaal antilichaam tegen PD-1. Blokkeert de PD-1 pathway.

#### Bijwerkingen:

- Infusiereacties:
  - koorts, koude rilling
  - huiduitslag
  - jeuk
  - gewrichtspijn
  - bronchospasmen
  - hyper- of hypotensie
- Misselijkheid
- Diarree
- Benauwdheid
- Vermoeidheid
- Huidreacties (uitslag, jeuk, netelroos, roodheid en droge huid)
- Verminderde eetlust
- Pneumonitis
- Buikpijn
- Anemie
- Gewrichtspijn of - stijfheid

Voor meer informatie zie DocPortal.

### Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- SIB op maat