

EORTC 1301
Allogene SCT
Decitabine (10 dagen)-Fludarabine - TBI

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT: 01970	Gefaxt naar apothek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m2)	Pat.studienr:
	Code kuur E2↓			
	<input type="checkbox"/>	339966C	chemo acute leukemie	
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor	Naam + paraaf VPK1	Naam + paraaf VPK2
Specialisme: IHM Indicatie: Allo-RIST voor patiënten in arm B van de EORTC 1301 Bron: EORTC 1301 protocol	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)			

kuur (dag -11) niet starten op dinsdag, woensdag of donderdag

Opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

** MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen

Datum	Dag	Tijden	GENEESMIDDEL	TW *	Dosis	Pomp- stand	Paraaf 1	Paraaf 2= aanhangen
	Dag -12		Time out procedure					
	Dag -11	10:00-11:00 Let op studierecept	DECITABINE 20mg/m ² in 50 ml NaCl0,9% inlooptijd 1uur	i.v.	mg			
	Dag -10	10:00 -11:00	DECITABINE 20mg/m ²	i.v.	mg			
	Dag -9	10:00 -11:00	DECITABINE 20mg/m ²	i.v.	mg			
	Dag -8	10:00 -11:00	DECITABINE 20mg/m ²	i.v.	mg			
	Dag -7	10:00 -11:00	DECITABINE 20mg/m ²	i.v.	mg			
	Dag -6	10:00 -11:00	DECITABINE 20mg/m ²	i.v.	mg			
	Dag -5	10:00 -11:00	DECITABINE 20mg/m ²	i.v.	mg			
	Dag -4	09:00 - 09:30	FLUDARABINE 30mg/m ² in 50ml NaCl0,9% in 30 minuten	i.v.	mg			
		10:00-11:00	DECITABINE 20mg/m ²	i.v.	mg			

	Dag -3	09:00 - 09:30	FLUDARABINE 30mg/m ²	i.v.	mg		
		10:00 -11:00	DECITABINE 20mg/m ²	i.v.	mg		
	en verder	10:00	Tacrolimus 0.03 mg/kg/i.v./dag continue infuus	i.v.	mg		
	Dag -2	09:00 - 09:30	FLUDARABINE 30mg/m ²	i.v.	mg		
		10:00 -11:00	DECITABINE 20mg/m ²	i.v.	mg		
	Dag -1		TBI 2 Gy				
	Dag 0		Stamcel infusie (<i>lijn zonder filter gebruiken</i>) Premedicatie 60min. voor teruggave: Clemastine (Tavegil) 1xdd Bij AB0 incompatibiliteit pre-hydratie: Zie separaat schema	i.v.	2mg		

Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS

Datum	Paraaf arts zodra in EVS geplaatst	Hydratieschema/ medicatie
		Dag – 11: 500ml NaCl 0,9%/ 24 uur
		Metoclopramide 3dd 10 mg i.v. zo nodig op de kuurdagen.
		Lorazepam 4dd 0.5 mg s.l., als sedativum toevoegen Z.N (niet als monotherapie) na de kuurdagen
		Dag -1: 60 min voor TBI 8 mg ondansetron(zofran)p.o.
		Start dag 0: Valaciclovir (Zelitrex) 2 dd 500 mg/p.o. Indien p.o. niet wordt verdragen: Aciclovir 3 dd 5 mg/kg/i.v.
		Start dag -11: Multivitamine zonder ijzer 1 dd 1 capsule
		Start dag -11: Norethisteron (Primolut N.) 2 dd 5 mg/p.o. (bij vrouwen voor de menopauze)
		Dag- 14: Ursodeoxycholzuur (Ursochol) start 2 weken voor TX. 2 dd 6mg/kg (tabletten 300mg) continueren. Zo nodig als drank geven. Dagdosis 2 dd.....mg
		Tacrolimus 0.03 mg/kg/i.v./dag continue infuus. Dosering aanpassen aan nierfunctie. conversiefactor naar oraal1 : 3 tot 4 Indien start oraal 2 dd 0.06 mg/kg (echter voorkeur starten met i.v.) Bij MUD : Dag +100 start taperschema -25% per maand tot stoppen Bij SIB donor: dag +56 start taperschema -25% per maand tot stoppen Dosering aanpassen aan nierfunctie en tacrolimus spiegel
		S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl
		Dag 0 start Mycopenolaat (cellcept/mofetil/MMF) Maximale orale dosis Mycopenolaat 3 gram per dag. Start dag 0. Eerste dosis 22 uur op de dag van (1 ^e) stamcelinfusie (minimaal 5 uur na stamcelinfusie). Bij MUD: 3 dd 15 mg/kg, max 3 x 1 gram/ dag Dag +40 start taperschema in 8 weken. Stop dag +96 Bij SIB: 2 dd 15 mg/kg, max 2 x 1,5 gram/ dag Stop dag +28. Geen taperschema
		Dag +28 Co-trimoxazol (Bactrimel) 2dd 960 mg/p.o. elke zaterdag en zondag
		Wekelijks CMV en EBV PCR
		Wekelijks Aspergillus galactomannan
		Wekelijks X-thorax
		Bloedproducten: bestraald.
		NB. Bij ontslag Tacrolimus, Mycopenolzuur(Mofetil), Ursodeoxycholzuur (Ursochol), Valaciclovir (Zelitrex), Multivitamine(zonder ijzer), Co-trimoxazol (Bactrimel) continueren. Bij steroïd gebruik tevens <i>Ciprofloxacine</i> (Ciproxin) en <i>Amoxicilline</i> toevoegen.
		Ma + do Tacrolimusspiegel bepalen

MEDISCHE INSTRUCTIES

- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam
- Diëtist in consult
- Datamanger (A. Nanninga, 40206) op de hoogte stellen van opname bij participatie in de studie voor centraal lab

VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES

- Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst

patiëntensticker

- Maatregelen kuur (ph meten urine, voorbereidingen, etc).
- Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 2 dagen na de laatste gift Fludarabine worden opgeheven; datum:
- Dagelijks wegen ten behoeve van vochtbalans.
- dagelijkse observatie en inspectie mucositis en instructie mondverzorging.
- Voorkeur op eenpersoonskamer
- Op dag 0 kwaliteit van leven formulier laten invullen (research verpleegkundige)
- Materiaal klaarzetten voor transplantatie:
 - Dag voor TX: zuigerij (vacuumklok, zuig- en verbindingsslang, yankauer, afzuigpot+zak) O2(O2-klok, O2-masker)
 - Dag van TX: spoedkar in de buurt plaatsen
 - Transplantatielijn zonder filter, gevuld met NaCl 0,9%. Geen bionecteur ertussen