

In studieverband :.....

Buiten studieverband

PECC

Therapielijst\ aftekenlijst\aanvraag cytostatica

Patiëntgegevens:	Datum aanvraag	Afdeling		Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)	
	Code kuur E2:			
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor		
Specialisme: IHMP Indicatie: Bron:	Afspraakcodes DC:	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

(Let op: deze lijst NIET insturen als recept!!!!)

DATUM	DAG	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS
	1	Lomustine 80 mg/m ²	p.o.	...mg
	1 t/m 5	Etoposide 100 mg/m ²	p.o.	...mg
	1 t/m 5	Chloorambucil 8 mg/m ²	p.o.	...mg
	1 t/m 5	Prednisolon 40 mg/m ²	p.o.	...mg

Achtergrondinformatie

Informatie over de geneesmiddelen:

Bijwerkingen:

- Lomustine
 - beenmergsuppressie (na 3-6 weken), cumulatief
 - misselijkheid en braken
 - stomatitis
 - nefrotoxiciteit en pulmonaire fibrose, voornamelijk bij hoge (>1100 mg/m²) cumulatieve dosering

- Etoposide
 - beenmergsuppressie
 - haaruitval
 - misselijkheid en braken
 - hypotensie en pulmonale klachten bij te snelle toediening
 - stomatitis
 - allergische reacties (huidreacties)

- Chloorambucil
 - beenmergsuppressie
 - zelden gastro-intestinale toxiciteit
 - huidafwijkingen, zelden haaruitval
 - zelden pulmonaire fibrose (kan echter fataal zijn)