

HOVON 151, ATEZOLIZUMAB

Consolidatie

Therapielijst \ aftekenlijst \ aanvraag cytostatica

Patiëntgegevens:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT: 02282	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)	
	Code kuur E2:	339966F		
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor		
Specialisme: IHMP Indicatie: DLBCL, IPI ≥ 3 Cyclusduur: 21 dagen Totaal: max. 54 weken Bron: protocol Hovon 151 DLBCL, versie 1, 15 feb 2018	Afspraakcodes DC: HO151-ATEZO-1: Kuur 1: 3,5 UUR HO151-ATEZO-2: Kuur ≥2: 1,5 UUR	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel) *Dosisreductie niet toegestaan, zie protocol voor criteria uitstel		

Kuurnummer: (1 of na reactie)

*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	INLOOP- TIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	POMP- STAND	TIV	TOELICHTING	Par. 1	Par. 2
								a. RR, pols, temp, ah		
	1	01:00	ATEZOLIZUMAB in NaCl 0,9% totaalvolume 291 ml <i>let op: studierecept nodig</i>	iv	1200 mg	291		0.2 µm filter <i>b,c,a</i>		
		02:00						observatie		

Kuurnummer (2 t/m 18):

DATUM	DAG	INLOOP- TIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	POMP- STAND	TIV	TOELICHTING	Par. 1	Par. 2
								a. RR, pols, temp, ah		
	1	00:30*	ATEZOLIZUMAB in NaCl 0,9% totaalvolume 291 ml <i>let op: studierecept nodig</i>	iv	1200 mg	582		0.2 µm filter <i>b,c,a</i>		

Verpleegkundige toedien-instructies

- a. Noteer controles vooraf en na infusie op **controlelijst**.
- b. Noteer start-en stoptijden op **controlelijst**.
- c. Observeer op infusiereactie.
- Observeer op ondervoeding: neem op dag 1 de MUST af.
- * Eerste infuus in 1 uur. Alleen indien eerste infuus goed getolereerd is mogen de volgende infusies in 30 minuten.


Medische instructies

- Indien infusiereactie bij kuur 1, dan vanaf kuur 2 antihistamine of antipyretica/analgetica als premedicatie voorschrijven.
- Wees bewust van de kans op het ontwikkelen van immuun gemedieerde bijwerkingen (zie protocol paragraaf 9.1)

patiëntgegevens

Achtergrondinformatie studie: Hovon 151, Atezolizumab consolidatie

Patients with DLBCL-NOS, Ann Arbor stage II-IV, IPI \geq 3, age 18-75
in metabolic complete remission after 6-8 cycles of R-CHOP



Informatie over de studie:

- Zie link naar webpagina hematologiegroningen.nl:
- Een fase 2 onderzoek naar de werkzaamheid van atezolizumab als aanvullende behandeling bij patiënten met een hoog risico diffuus grootcellig B-cel lymfoom.
- Indicatie: patiënten met een hoog risico diffuus grootcellig B-cel lymfoom, die behandeld zijn met 6-8 kuren R-CHOP, waarbij geen ziekte-activiteit meer aantoonbaar is op de PET-scan.

Informatie over de geneesmiddelen:

- Atezolizumab: een monoklonaal antilichaam gericht tegen het program death ligand 1 (PDL1).

Bijwerkingen:

- Neutropenie, diarree, hoofdpijn, infecties, koorts, kortademigheid, vermoeidheid

Voor meer informatie zie protocol op www.hematologiegroningen.nl

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- SIB op maat
- Studie-informatie uitgereikt door arts

Contact

- Onderzoeksarts: dr. M. Nijland
- Researchverpleegkundige: E. Janssen tel: 11116
- Researchverpleegkundige dagcentrum: I. den Boer tel: 13631

Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Informeer de patiënt de arts te waarschuwen zodra hij/zij late infusiereacties opmerkt.

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Niet van toepassing, of op advies hoofdbehandelaar indien reactie in kuur 1

patiëntgegevens

Controlelijst: Hovon 151, Atezolizumab, consolidatie

Kuur:.....

Datum:.....

Sticker patiëntgegevens

Start- en stoptijden:

	Starttijd	Stoptijd	Bijzonderheden	Paraaf
Atezolizumab				

Controles:

Tijd	Tijd	RR	Pols	Temp	AH	Paraaf
Vooraf aan infusie (niet langer dan 60 min voor start)						
Einde infusie						