

In studieverband
 Buiten studieverband

BEAM
Transplantatie-chemotherapie-schema

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT:	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m2)	Pat.studienr:
	Code kuur E2↓			
	<input type="checkbox"/>	339966B	chemo gemetast	
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor	Naam + paraaf VPK1	Naam + paraaf VPK2
Specialisme: IHM Indicatie: autologe stamceltransplantatie bij agressief, recidief of progressief lymfoom Totaal: aansluitend op inductie behandeling Bron: Hovon 44, 75 en 98	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)			

kuur (dag -6)niet starten op zondag of maandag

Opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

** MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen

Datum	Dag	Tijden	GENEESMIDDEL	TW *	Dosis	Pompstand	Paraaf 1	Paraaf 2= aanhangen
	Dag -7		Time out procedure					
			plaatsen CVK					
	Dag -6	08.00-08.15	Premedicatie (2 uur voor Carmustine) Clemastine (Tavegil®) Methylprednisolon (Solumedrol®) inlooptijd: 15 min.	i.v. i.v.	2mg 100mg		** **	** **
		10.00-11.00	CARMUSTINE Totaal 1dd 300 mg/m ² in 500 ml Glucose 5% inlooptijd: 1 uur.	i.v.	mg			
	Dag -5	07.00-09.00	CYTARABINE Totaal 2dd 100 mg/m ² in 250 ml NaCl 0,9% inlooptijd: 2 uur	i.v.	mg			
		10.00-12.00	ETOPOSIDE Totaal 2dd 100 mg/m ² in 500 ml NaCl 0,9% inlooptijd: 2 uur	i.v.	mg			
		19.00-21.00	CYTARABINE 100 mg/m ²	i.v.	mg			
		22.00-24.00	ETOPOSIDE 100 mg/m ²	i.v.	mg			

	Dag -4	07.00–09.00	CYTARABINE 100 mg/m ²	i.v.	mg		
		10.00–12.00	ETOPOSIDE 100 mg/m ²	i.v.	mg		
		19.00–21.00	CYTARABINE 100 mg/m ²	i.v.	mg		
		22.00–24.00	ETOPOSIDE 100 mg/m ²	i.v.	mg		
	Dag -3	07.00–09.00	CYTARABINE 100 mg/m ²	i.v.	mg		
		10.00–12.00	ETOPOSIDE 100 mg/m ²	i.v.	mg		
		19.00–21.00	CYTARABINE 100 mg/m ²	i.v.	mg		
		22.00–24.00	ETOPOSIDE 100 mg/m ²	i.v.	mg		
	Dag -2	07.00–09.00	CYTARABINE 100 mg/m ²	i.v.	mg		
		10.00–12.00	ETOPOSIDE 100 mg/m ²	i.v.	mg		
		19.00–21.00	CYTARABINE 100 mg/m ²	i.v.	mg		
		22.00–24.00	ETOPOSIDE 100 mg/m ²	i.v.	mg		
	Dag -1	10.00–10.15	MELFALAN* Totaal 140 mg/m ² in 100 ml NaCl 0,9% inlooptijd: 15 min.	i.v.	mg		
	Dag 0	Minimaal 24 uur na Melfalan gift	TERUGGAVE STAMCELLEN Premedicatie: ½ uur voor teruggave Hydrocorticon (Solucortef®) Clemastine (Tavegil®) inlooptijd: 5-10 min	i.v. i.v.	100 mg 2 mg	** **	** **

patiëntensticker

Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS

Datum	Paraaf arts zodra in EVS geplaatst	Hydratieschema/ medicatie
		Hyperhydratie start op dag -7 t/m dag +1:l.(standaard 3 l) Gluc2.5%/NaCl0,45% met per liter:ml KCL (20 ml)
		Dag -7 t/m dag +1: Furosemide (Lasix) 2 ddmg push/i.v.
		Dag-6: 1dd 2mg Clemastine (Tavegil®) (2 uur voor Carmustine gift)
		Dag-6: 1 dd 100mg Methylprednisolon (Solumedrol®)
		Van dag -6 t/m -1 Ondansetron (Zofran)2 dd 8 mg/i.v.
		Dag -1: Aprepitant 125 mg en Dexamethason 12 mg p.o.
		Dag 0 en dag+1: Aprepitant 80 mg en Dexamethason 8 mg p.o.
		Dag0: 1 dd 100mg Hydrocorticon (Solucortef®) voor stamcelteruggave
		Dag 0: 1 dd 2mg Clemastine (Tavegil®) voor stamcelteruggave
		Metoclopramide 3dd 10 mg (zn).
		S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl
		6dd Hypromellose 0,3% oogdruppels. Dag -5 t/m regeneratie
		Norethisteron (Primolut N.) 2 dd 5 mg/p.o. (bij vrouwen voor de menopauze)
		Penicilline 4 dd 1 milj. IE/i.v. Start dag + 1 t/m herstel bloedwaarden
		Bloedproducten bestralen tot 1 jaar na TX
		Valaciclovir (Zelitrex) profylaxe na ontslag, gedurende 3 mnd. (2 dd 500mg/p.o.)

MEDISCHE INSTRUCTIES

- CVK
- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam
- Maximum dosering chemotherapie dosering gebaseerd op lichaamsoppervlak van $2,2m^2$.
- Controleren of artsenverklaring voor Carmustine bij de apotheek ontvangen is
- Check focusonderzoek: KNO en mondheilkunde
- ECG controle (zie anti-emetica beleid, mogelijke interacties)

VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES

- Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
- * Bij **Melfalan** toediening en bij spoelen de patiënt **ijs** in de mond geven.
- * Melfalan is onverenigbaar met glucose-oplossingen
- # **Carmustine** : voor- en naspoelen met Gluc 5%
- Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 5 dagen na de laatste gift Etoposide worden opgeheven; datum:
- Dagelijks wegen ten behoeve van vochtbalans, indien toename gewicht overleg betreffende extra Furosemide gift
- Dagelijkse observatie en inspectie mucositis en instructie mondverzorging.
- Huidverzorging: Vette zalf aanbieden, evt. katoenen handschoenen geven bij rash van de huid/handen t.g.v. Cytarabine.
- Adviseer patiënt: voeten vettig houden en dikke sokken dragen.
- Assisteer patiënt bij toedienen oogdruppels, indien hypromellose niet afdoende is (gevoel van zand in de ogen) overleg met arts mbt andere oogdruppels zoals corticosteroïde-druppels).
- Materiaal klaarzetten voor transplantatie:
 - Dag voor TX: zuigerij (vacuumklok, zuig- en verbindingsslang, yankauer, afzuigpot+zak) O2(O2-klok, O2-masker)
 - Dag van TX: spoedkar in de buurt plaatsen
 - Transplantatielijn zonder filter, gevuld met NaCl 0,9%. Geen bionecteur ertussen